

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА:

БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ, ПОЯВЛЕНИЕ ОБЩЕЙ
СЛАБОСТИ;

СНИЖЕНИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА, ПОТЕРЯ
ВЕСА;

ПОВЫШЕННАЯ ПОТЛИВОСТЬ, ОСОБЕННО ПОД УТРО И В
ОСНОВНОМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТУЛОВИЩА;

ПОЯВЛЕНИЕ ОДЫШКИ ПРИ НЕБОЛЬШИХ ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗКАХ;

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ, НЕОЩУЩАЕМОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО $+37,2$ $+37,8$;

ДЛИТЕЛЬНЫЙ НЕ ПОДДАЮЩИЙСЯ ЛЕЧЕНИЮ КАШЕЛЬ
ИЛИ ПОКАШЛИВАНИЕ С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОКРОТЫ
(ВОЗМОЖНО С КРОВЬЮ);

ЭТИМ ПРИЗНАКАМ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЮДИ ЧАСТО НЕ
ПРЕДАЮТ БОЛЬШОГО ЗНАЧЕНИЯ И НЕ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, ЛИБО ЗАНИМАЮТСЯ
САМОЛЕЧЕНИЕМ;

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
СИМПТОМОВ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПОЛИКЛИНИКУ ПО
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. ВРАЧ НАЗНАЧИТ НЕОБХОДИМОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ.

