

КАК МОЖНО ВЫЯВИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ ?

НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ И ДОСТУПНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ НА НАЛИЧИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ БАКТЕРИЙ.

ТУБЕРКУЛЕЗ МОЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ – ЭТО ФЛЮОРОГРАФИЯ И РЕНТГЕНОГРАФИЯ.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ НА НАЛИЧИЕ МИКОБАКТЕРИЙ (ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ).

ДРУГИМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ ТУБЕРКУЛИНОВАЯ ПРОБА – РЕАКЦИЯ МАНТУ ИЛИ ДИАСКИНТЕСТ. ДАННЫЕ ПРОБЫ БЕЗВРЕДНЫ.

ВОВРЕМЯ ПОСТАВЛЕННЫЙ ДИАГНОЗ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ.

БОЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ МОЖЕТ И НЕ ПОДОЗРЕВАТЬ О СВОЕМ ЗАБОЛЕВАНИИ.

ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО (ОДИН РАЗ В ГОД) ПРОХОДИТЬ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.

